

Terpropil®

Crema - Solución

Acción terapéutica	<p>Terpropil® contiene como principio activo Nitrofurazona. Cada gramo de Terpropil® crema o solución contiene 2 mg de Nitrofurazona.</p> <p>La Nitrofurazona es un derivado de nitrofurano con actividad antiséptica y desinfectante, con acción antibacteriana sobre un amplio espectro de microorganismos gram positivos y gram negativos, es eficaz contra la mayoría de los gérmenes responsables de las infecciones superficiales, incluso de aquellas que se han tornado antibiótico resistentes.</p>
Modo de acción	<p>Actúa por alteración del metabolismo enzimático de la célula bacteriana, aún en presencia de sangre, suero o pus. Es utilizado en infecciones mixtas comunes que contaminan heridas, quemaduras, úlceras y vías urinarias.</p>
Indicaciones	<p>Terpropil® crema: heridas, úlceras, quemaduras de segundo y tercer grado, piodermitis e infecciones de la piel. Indicada únicamente en adultos.</p> <p>Terpropil® solución: está indicado en adultos. En aplicación local, tratamiento alternativo de quemaduras de segundo y tercer grado. Infecciones de la piel. Preparación de superficies en injertos de piel, donde la contaminación bacteriana puede causar rechazo del injerto o infección en el trozo donante, especialmente en centros con historia de resistencia bacteriana.</p>
Aplicación y dosis	<p>Aplicar directamente sobre la lesión 1 o 2 veces al día y cubrir con un vendaje protector. El cambio de curación estará indicado por el médico tratante. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 3 días de tratamiento debe interrumpir el tratamiento y consultar a su médico.</p> <p>Terpropil® crema y solución poseen excipientes hidrosolubles que permiten un fácil retiro de la lesión, ejerce una acción lubricante y protectora de las superficies en tratamiento sin impedir el drenaje de exudados.</p>
Contraindicaciones	<p>La incidencia de sensibilización es casi nula, pueden ocurrir reacciones adversas en pacientes hipersensibles a los nitrofuranos o a cualquiera de los excipientes.</p>
Reacciones adversas	<p>Micosis oportunistas, posibilidad de dermatitis de contacto.</p>
Advertencia	<p>Sobrecrecimiento de microorganismos no susceptibles. Terpropil® solución: en pacientes con trastornos renales pueden producirse síntomas de deterioro renal si se produce acumulación de los excipientes. Terpropil® solución contiene 300 mg de propilenglicol por gramo de solución. El propilenglicol puede provocar irritación en la piel. No utilizar en heridas abiertas o grandes áreas de piel dañada (como quemaduras) sin consultar antes con su médico.</p>
Embarazo	<p>No se dispone de datos suficientes sobre la utilización de nitrofurazona en mujeres embarazadas. Los estudios en animales son insuficientes para determinar las reacciones en el embarazo.</p>
Lactancia	<p>Se desconoce si la nitrofurazona es excretada en la leche humana. Un riesgo para el lactante no puede ser descartado.</p>

