

## Propóleos 3% emulsión (jarabe)

### Composición

Cada gramo de Propóleo-D® emulsión (jarabe) contiene 0.03 g de propóleos estabilizado y excipientes c.s. Su composición está determinada por diferentes grupos químicos entre los que se destacan por su importancia los flavonoides (galangina, crisina, tectocrisina, isalpinina, pinocembrina y derivados). Acido benzoico y derivados, ácido cinámico, alcohol cinámico y derivados (ácido cafeico, ferúlico y bencílico). Derivados del benzaldehido, compuestos terpénicos, aceites esenciales y la enzima catalaza.

### Propiedades

*Acción inmunoestimulante:* Se ha demostrado que Propóleo-D® emulsión (jarabe) administrado por vía oral posee un importante efecto estimulante del sistema inmunitario. Aumenta la respuesta específica y no específica de la inmunidad celular y humoral.

El propóleos estimula la actividad de los macrófagos y la eleva casi al doble; asimismo se observa aumento del número de linfocitos y una mayor respuesta inmune. También inhibe la degranulación del mastocito responsable de reacciones alérgicas como el asma, faringitis y amigdalitis crónica.

*Acción antiinflamatoria:* la administración de Propóleo-D® emulsión (jarabe) por vía oral posee una importante acción antiinflamatoria en afecciones respiratorias altas y bajas.

### Otras propiedades

Propóleo-D® emulsión (jarabe) posee a nivel local acción antimicrobiana; potencia la acción de los antibióticos e intensifica y prolonga la acción antibacteriana de los mismos. Su contenido en aceites esenciales le confieren una acción emoliente y balsámica que colabora a descongestionar las vías respiratorias atenuando la tos y la irritación. Propóleo-D® emulsión (jarabe) permite reducir la administración de otras medicaciones (antialérgicos, broncodilatadores, corticoides) previniendo las crisis de broncoespasmo. Propóleo-D® emulsión (jarabe) fluidifica la secreción y permite la rápida expectoración.

### Indicaciones

Afecciones respiratorias y complemento en el tratamiento de enfermedades infecciosas

### Posología

Una dosis corresponde a 5 mL de Propóleo-D® emulsión (jarabe), que contiene 200 mg de propóleos estabilizado.

Adultos y niños mayores de 6 años: 1 dosis cada 8 horas.

Menores de 6 años: 2,5 mL (½ dosis) cada 8 horas.

La dosis de mantenimiento es 1 toma cada 12 o 24 horas.

### Contraindicaciones

Hipersensibilidad al Propóleos.

Contiene azúcar. Los diabéticos deben mantener control médico, o sustituir y/o complementar el tratamiento con Propóleo-D® cápsulas.

### Reacciones adversas

Muy poco frecuentes, en personas hipersensibles erupción cutánea.

### Embarazo y lactancia

Tomar con precaución durante el primer trimestre del embarazo y lactantes menores de 6 meses

### Sobredosificación

Puede producir náuseas y ardor epigástrico.

### Interacciones

No se conocen interacciones con otros medicamentos.

Agite energicamente antes de tomar.

A bajas temperaturas puede solidificar, en este caso coloque a baño